

# Maxforce Quantum

---

Insekticídna nástraha vo forme riedkej pasty pre profesionálne použitie určená k ničeniu mravcov faraónskych a mravcov čiernych.

## Účinná látka:

Imidakloprid (EC 428-040-8) 0,3 g/kg



**H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.**

**EUH 401 Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizik pre zdravie ľudí a životné prostredie.**

**P501 Zneškodnite obsah/nádobu bezpečným spôsobom.**

## Účinok:

Nástrahu prijímajú mravce ako potravu a zároveň je robotnicami zanášaná do hniezd, kde pôsobí na ďalších členov kolónie (larvy a kráľovné). Prvé príznaky pôsobenia nástrahy sú viditeľné už za 7 dní, ale k úplnému zničeniu kolónie dochádza za 2-4 týždne v závislosti od veľkosti populácie. Nástraha zostáva účinná minimálne počas 12 týždňov. U mravce čierneho a príbuzných druhov sú prvé účinky vidieť už po 3 dňoch, k úplnej likvidácii kolónie dôjde za 7-14 dní. Vo vonkajšom prostredí zostáva účinná 7-10 dní ak nedojte ku zmytí dažďom.

## Návod na použitie:

Prípravok je určený na ošetrovanie potravinárskych prevádzok, reštaurácií, bytov, hotelov, nemocníc, kancelárií, skladov, chovov laboratórných zvierat a ďalších miest s výskytom mravcov faraónskych.

Prípravok je určený aj na ničenie mravcov čiernych v okolí budov. Ošetrojú sa chodníky, cestičky, terasy, murivo a pod. Nesmie sa používať v trávnatých plochách, v záhonoch a podobných miestach.

Nástraha sa aplikuje pomocou špeciálneho aplikátora a to na miestach výskytu mravcov – na ich cestičkách, v okolí hniezd, prípadne priamo do vstupov, do prasklín, štrbín a pod. Pri aplikácii vo vnútri budov sa vyhnite miestam, ktoré sú prašné, mastné alebo vlhké. V okolí budov sa odporúča nástrahu ukladať priamo do vstupov hniezd (otvory, štrbiny) a na miesta ktoré sú chránené pred dažďom. Ak dažď nástrahu zmyje do 24 hodín od aplikácie je potrebné zasah opakovať. Rovnako sa postupuje i v prípade, ak mravce nástrahu do 24 hodín celkom spotrebujú. Po skončení práce tubu alebo vyústenie aplikátora zatvorte krytkou, aby nástraha nevytekala.

## Dávkovanie:

Vnútorne priestory (mravec faraónsky) – 1 kvapka s hmotnosťou 0,2 g/m<sup>2</sup> ošetrovanej plochy (kuchyňa o rozlohe 10 m<sup>2</sup> = 10 kvapiek o hmotnosti 0,2 g).

Okolie budov (mravec čierny) – aplikujte kvapky s hmotnosťou 0,2 g do hniezd a ich okolia. Celkom použite cca 2 g prípravku na 1 hniezdo. Ak nie je vidieť vstup do hniezda v okolí budovy, vykoná sa aplikácia vo vnútri na miesta výskytu.

Vyložení nástrahu je potrebné pravidelne kontrolovať a dopĺňovať podľa potreby.

Nástrahu neaplikujte na miesta, ktoré sa bežne umývajú. Prípravok neaplikujte na miesta ktoré boli ošetrené chemickým postrekom. Postrek sa nesmie aplikovať na nástrahu. Pachy z chemických látok nástrahu znehodnotia, stáva sa neatraktívna pre hmyz.

## Bezpečnostné opatrenia:

Pri práci používajte ochranný odev (typ 6), gumené rukavice (min. hrúbka 0,4 mm, podľa EN 374) a ochranné okuliare (podľa EN 166). Pred prestávkami a po skončení práce si dôkladne umyte ruky teplou vodou a mydlom. Prípravok aplikujte na miesta nedostupné deťom a domácim zvieratám. Pri práci je zakázané piť, jesť a fajčiť. Zabráňte kontaktu s kožou a sliznicami. Prípravok používajte podľa návodu a dbajte, aby nedošlo ku kontaminácii potravín, vody a krmív. Tuby neotvárajte násilím. Prípravok sa dá odstrániť vlhkou špongiou. Bezpečnostné opatrenia pri požiari: pri horení sa uvoľňuje oxid uhoľnatý. Pri hasení je potrebné použiť dýchací prístroj.

## Prvá pomoc:

*Pri požití:* vypláchnite ústa vodou a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Nevyvolávajte zvracanie.

*Pri zasiahnutí očí:* vyplachujte prúdom pitnej vody najmenej 15minút (po 5 minútach odstráňte kontaktné šošovky pokiaľ sú používané). Vyhl'adajte lekárske ošetrovanie ak podráždenie pretrváva. .

*Pri zasiahnutí pokožky:* zasiahnutú pokožku dôkladne umyte teplou vodou a mydlom.

Pri otrave, alebo podozrení na otravu, privolajte lekára, ktorého informujte o prípravku, poskytnutej prvej pomoci a telefónnom čísle **Národného toxikologického informačného centra - 02/ 54774166** , kde v prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať.

**Skladovanie:**

Skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v suchých, chladných, uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, liekov, krmív a chemických látok. Teplota skladovania 5 – 40 °C.

Chráňte pred mrazom a tepelnými zdrojmi. Doba skladovania v originálnych neotvorených obaloch je 2 roky od dátumu výroby.

**Likvidácia obalov a zvyškov prípravku:**

Prázdne obaly (tuby) po znehodnotení spál'te v schválenej spaľovni. Prípadné zvyšky prípravku spál'te v spaľovni rovnakých parametrov ako obaly.

**Balenie, hmotnosť:** 4 x 30 g (PE tuby)

**Číslo šarže a dátum výroby:** uvedený na obale

**Výrobca:** Bayer SAS, 16, rue Jean-Marie-Laclair, 69009, Lyon, Francúzsko

**V SR registruje:** Bayer s.r.o., Siemsenova 4, 155 00 Praha 5, ČR, tel. 00420266101111

**Registračné číslo:** bio/644/D/08/CCHLP